

បរិយាយប័ណ្ណឱសថ
ហ្វ្រូស៊ីយ៍ ចាត់តាមសរសៃឈាម

FERROSPEY

Elemental Iron 100mg

I រួមភាពឱសថ :

-ជាឱសថប្រភេទទឹកសំរាប់ចាក់តាមសរសៃឈាម

-១ប្រអប់មាន ៥អំពុល ១អំពុលមានចំណុះ 5ml

II សមាសធាតុផ្សំ : ក្នុង 5ml មាន៖

-Elemental Iron..... 100mg

III គុណភាពព្យាបាល :

ឱសថនេះប្រើសំរាប់ព្យាបាលជំងឺខ្វះជាតិដែក ដូចខាងក្រោម៖

-សំរាប់ជំងឺដែលត្រូវការការចែកចាយជាតិដែកឆាប់ហើសទៅកាន់កន្លែងស្តុកទុកជាតិដែកក្នុងខ្លួន។

-សំរាប់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកតាមមាត់បាន។

-សំរាប់អ្នកមានជំងឺរលាកពោះវៀនស្រួចស្រាវ ហើយដែលការប្រើថ្នាំជាតិដែកលេបតាមមាត់មិនមាន ប្រសិទ្ធភាព។

ការប្រើប្រាស់ :

ឱសថនេះហាមប្រើចំពោះ​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

-អ្នកងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំណាមួយនៃឱសថនេះ

-អ្នកមានជំងឺស្នែកស្លាំងដែលមិនទាក់ទងជាមួយនិងបញ្ហាកង្វះជាតិដែក

-អ្នកមានជំងឺលើសកំរិតជាតិដែកក្នុងខ្លួន ឬមានវិបត្តិការប្រើប្រាស់ជាតិដែកក្នុងខ្លួន

V ការប្រែប្រួលឃ័ត្រ :

ឱសថនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

-ចំពោះអ្នកមានជំងឺហឺត ជំងឺរ៉េម ជំងឺអាស្ត្រែកហ្ស៊ី

-ចំពោះអ្នកងាយមានប្រតិកម្មអាស្ត្រែកហ្ស៊ីជាមួយសូលុយស្យុងជាតិដែកសំរាប់ចាក់ផ្សេងទៀត

-ចំពោះអ្នកមានជំងឺឱ្យាយមុខងារធ្វើម

-ចំពោះអ្នកមានជំងឺឆ្លងស្រួចស្រាវ

-ចំពោះអ្នកមានជំងឺកង្វះអាស៊ីតហ្វូលិក ឬថយចុះកំរិតសេរ៉ូមជាតិដែកក្នុងឈាម

-សូលុយស្យុងជាតិដែកសំរាប់ចាក់ អាចបណ្តាលឲ្យមានប្រតិកម្មអាស្ត្រែកហ្ស៊ី និងហ្សុកអាណាហ្វឺឡាក់ទិកកើតឡើង។ ដូច្នេះ វិធានការសំរាប់បង្ការ

ឬព្យាបាលប្រតិកម្មអាស្ត្រែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវត្រៀមជាចាំបាច់។

-ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលកំរិតជាតិដែកក្នុងឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ជាពិសេសពេលប្រើចំពោះអ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារធ្វើម

-ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើឱសថនេះចំពោះអ្នកជំងឺដែលរកឃើញថាមានជំងឺបាក់តេរីក្នុងឈាម

-ការចាក់ថ្នាំនេះលឿនពេកអាចបណ្តាលឲ្យសំពាធឈាមថយចុះ

-ការប្រើថ្នាំនេះលើសកំរិតណានាំអាចបណ្តាលឲ្យឈឺសន្លាក់

-ត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានហូរថ្នាំចេញក្រៅសរសៃឈាមពេលចាក់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យឈឺលើកន្លែងចាក់ រលាក ក្រិន ជាលិកាស្បែក និងស្បែកឡើងពណ៌ផ្កាត

-ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៖ ឱសថនេះមិនណែនាំឲ្យប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងត្រីមាសទី១ តែអាចប្រើក្នុងត្រីមាសទី២និងទី៣កាលណាផលចំណេញមានច្រើជាងហានិភ័យលើទារកក្នុងផ្ទៃ។

-ចំពោះស្ត្រីបំបៅដោះកូន៖ ត្រូវផ្អាក ឬបញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូនគំឡុងពេលប្រើឱសថនេះ

-មិនត្រូវប្រើឱសថនេះលើសកំរិតណែនាំ

-មិនត្រូវប្រើឱសថនេះហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់

VI ផលប៉ះខាន :

វិបត្តិប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល៖ ភ្លាវក្នុងមាត់ ឈឺក្បាល ឆេងឆោង ឈឺធ្មេបៗចុងម្រាមដៃម្រាមជើង សន្លប់ មិនអាចផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អ មានអារម្មណ៍ក្រហាយ

វិបត្តិប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរយៈដួង៖ សំពាធឈាមថយចុះ រយៈដួងដើរញាប់ ញីរទ្រូង និងសំពាធឈាមកើនឡើង

វិបត្តិប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម៖ កន្ត្រាក់ទងសួត ពិបាកដកដង្ហើម

វិបត្តិក្រពះពោះវៀន៖ ចង្អោរ កូត វាត ឈឺពោះ

វិបត្តិស្បែកនិងជាលិកាស្បែក៖ កន្ទួលក្រហមស្បែក រមាស់ស្បែក កន្ទាលត្រអាក ហើមស្បែក

វិបត្តិឆ្អឹងសាច់ដុំ៖ ឈឺសាច់ដុំ រមួលក្រពើ

វិបត្តិប្រព័ន្ធស្នាសវិវាង៖ ប្រតិកម្មអាណាហ្វឺឡាក់ទិក (គំរកើតមាន)

វិបត្តិទូទៅនិងនៅលើកន្លែងចាក់៖ ក្តៅខ្លួន ញីរខ្លួន មុខឡើងក្រហម ឈឺទ្រូងនិងណែនទ្រូង អស់កម្លាំង និងវិបត្តិលើកន្លែងចាក់ដូចជា ឈឺលើកន្លែងចាក់ រលាកសរសៃឈាម ក្រហាយ ហើម

VII អន្តរកម្មឱសថ :

គួរជៀសវាងប្រើរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយជាមួយឱសថដូចខាងក្រោម៖

-ឱសថជាតិដែកសំរាប់ចាក់ផ្សេងទៀត។

-ឱសថនេះអាចប្រើឈាយជាមួយសេរ៉ូមប្រៃ sodium chloride 0.9% តែប៉ុណ្ណោះ។

VIII ការអន្យាទូក :

-ត្រូវទុកនៅក្រោមសីតុណ្ហភាព ៣០°C

-ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅថ្ងៃ និងសំណើម

-ត្រូវទុកឲ្យផុតពីដៃកូនក្មេង។

IX កំរិត និងរបៀបប្រើ :

❖ របៀបប្រើ :

-ឱសថនេះប្រើចាក់តាមសរសៃឈាមតែប៉ុណ្ណោះ។

-ឱសថនេះត្រូវចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាម ឬចាក់ឈាយជាមួយសេរ៉ូមប្រៃព្យតាមសរសៃឈាម។

-មុនពេលប្រើ កំរិតប្រើដំបូងចំពោះអ្នកជំងឺថ្មីម្នាក់ ត្រូវធ្វើតេស្តកំរិតប្រើនៃឱសថនេះសិន។

-មិនត្រូវប្រើឱសថនេះចាក់តាមសាច់ដុំទេ។

-មុនពេលបើកអំពូលថ្នាំ ត្រូវពិនិត្យមើលអំពូលថ្នាំ និងសូលុយស្យុងក្នុងអំពូលថ្នាំថាតើវាមានប្រេះស្រាំ ឬមានកកក្នុងអំពូលថ្នាំដែរឬទេ។

❖ កំរិតប្រើ :

សំរាប់ប្រើឈាយជាមួយសេរ៉ូមស្យូមស្យូមសរសៃឈាម៖

-ជាការល្អប្រសើរ ឱសថនេះត្រូវចាក់ឈាយជាមួយសេរ៉ូមព្យតាមសរសៃឈាម ដើម្បីបន្ថយសំពាធគ្រាប់ឈាមនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានហូរស្គុលយស្យុងថ្នាំក្រៅសរសៃឈាម។

-ភ្លាមៗ មុនពេលចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃឈាម ត្រូវឈាយឱសថនេះជាមួយសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩%(sodium chloride 0.9%)

ក្នុងសមាមាត្រ ១:២០, ឧទាហរណ៍ ឈាយ 1ml (20mg នៃជាតិដែក) ទៅក្នុង 20ml នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩%(sodium chloride 0.9%)។

ការឈាយសូលុយស្យុងថ្នាំនេះត្រូវធ្វើភ្លាមៗមុនពេលព្យតាមសរសៃឈាម ហើយសូលុយស្យុងថ្នាំនេះត្រូវប្រើដូចខាងក្រោម៖

- 100mg នៃជាតិដែក (5ml នៃឱសថ Ferrospey) ត្រូវព្យតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់១៥នាទី
- 200mg នៃជាតិដែក (10ml នៃឱសថ Ferrospey) ត្រូវព្យតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់៣០នាទី
- 300mg នៃជាតិដែក (15ml នៃឱសថ Ferrospey) ត្រូវព្យតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោច១ម៉ោងនិង៣០នាទី
- 400mg នៃជាតិដែក ត្រូវព្យតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ២ម៉ោងនិង៣០នាទី
- 500mg នៃជាតិដែក ត្រូវព្យតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៣ម៉ោងនិង៣០នាទី
- ការចាប់ផ្តើមប្រើកំរិតអតិបរិមា 7mg នៃជាតិដែក ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន១គីឡូក្រាម ត្រូវធ្វើឡើងដោយការព្យរសេរ៉ូមក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៣ម៉ោងនិង៣០នាទី។

-កំរិតប្រើដំបូង 20mg នៃជាតិដែក (1ml នៃសូលុយស្យុងថ្នាំនេះ) ត្រូវប្រើជាតំរិតធ្វើតេស្តពេលព្យរសេរ៉ូម ក្នុងរយៈពេលលើសពី១៥នាទី។

ប្រសិនបើមិនមានប្រតិកម្មរំខានកើតឡើងក្នុងពេលធ្វើតេស្តនេះទេ កំរិតប្រើ ដែលនៅសល់ក្នុងសូលុយសេរ៉ូមត្រូវបន្តប្រើ ក្នុងអត្រាបង្គួរមិនលើសពី

100mg នៃជាតិដែក ក្នុងរយៈពេល១៥នាទី។

សំរាប់ប្រើចាក់តាមសរសៃឈាម៖

-ត្រូវចាក់ថ្នាំនេះយឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងអត្រា 1ml នៃសូលុយស្យុងថ្នាំ ក្នុងរយៈពេល១នាទី ហើយមិនត្រូវប្រើលើសពី 10ml នៃសូលុយស្យុងថ្នាំ

(200mg នៃជាតិដែក) ពេលចាក់ម្តងទេ។

-មុនពេលប្រើ ចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាម កំរិតធ្វើតេស្ត 1ml នៃសូលុយស្យុងថ្នាំ (20mg នៃជាតិដែក) ត្រូវចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេលពី១ទៅ២នាទី។

ប្រសិនបើមិនមានប្រតិកម្មរំខានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល១៥នាទីពេលធ្វើតេស្តនេះទេ ត្រូវបន្តប្រើសូលុយស្យុងថ្នាំដែលនៅសល់។

ក្រោយពេលចាក់ថ្នាំនេះរួច អ្នកជំងឺត្រូវបានណែនាំឲ្យលាដៃឲ្យត្រង់។

សំរាប់ប្រើចាក់តាមឧបករណ៍លាចឈាម៖

-សូលុយស្យុងថ្នាំនេះអាចប្រើចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមតាមរយៈឧបករណ៍លាងឈាមផ្ទាល់តែម្តងបានតាមកំរិតប្រើដូចក្នុងការចាក់តាមសរសៃឈាមដែរ។

-មុនពេលប្រើ ចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាម កំរិតធ្វើតេស្ត 1ml នៃសូលុយស្យុងថ្នាំ (20mg នៃជាតិដែក)ត្រូវចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេលពី១ទៅ២នាទី។

ប្រសិនបើមិនមានប្រតិកម្មរំខានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល១៥នាទីពេលធ្វើតេស្តនេះទេ ត្រូវបន្តប្រើសូលុយស្យុងថ្នាំដែលនៅសល់។

ក្រោយពេលចាក់ថ្នាំនេះរួច អ្នកជំងឺត្រូវបានណែនាំឲ្យលាដៃឲ្យត្រង់។

សំរាប់ប្រើចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺខ្សោយកំរៃនោមដែលនាក់ធននីឲការលាចឈាមតាមសរសៃឈាម៖

-ត្រូវចាក់ថ្នាំនេះយឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងអត្រា 1០០mg នៃកំរិតជាតិដែកនៃសូលុយស្យុងថ្នាំ ក្នុងរយៈពេលពី២ទៅ៥នាទី ឬប្រើឈាយជាមួយសូលុយសេរ៉ូមប្រៃក្នុងអត្រា

1០០mg នៃជាតិដែកនៃសូលុយស្យុងថ្នាំ ក្នុង1០០mlនៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩% ដោយព្យតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់១៥នាទី

នៅរៀងរាល់ការលាងឈាមម្តងៗ។ឱសថនេះត្រូវប្រើអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការណ៍លាងឈាម។

-កំរិតប្រើសរុបធម្មតានៃឱសថនេះគឺ 1០០០mg។ ឱសថនេះអាចប្រើម្តងទៀតបាន នៅពេលណាដែលមានការថយចុះកំរិតជាតិដែកក្នុងឈាមកើតឡើង។

សំរាប់ប្រើចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺខ្សោយកំរៃនោមដែលមិននាក់ធននីឲការលាចឈាម៖

-ត្រូវចាក់ថ្នាំនេះយឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងអត្រា 2០០mg នៃកំរិតជាតិដែកនៃសូលុយស្យុងថ្នាំ ក្នុងរយៈពេលពី២ទៅ៥នាទី ឬប្រើឈាយជាមួយសូលុយសេរ៉ូមប្រៃ

ក្នុងអត្រា 2០០mg នៃជាតិដែកនៃសូលុយស្យុងថ្នាំក្នុង1០០ml នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩% ដោយព្យតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់១៥នាទី។

មិនមានការសិក្សាបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅលើកំរិតប្រើឱសថនេះនៅពេលប្រើឈាយជាមួយសូលុយសេរ៉ូមប្រៃក្នុង អត្រា 5០០mg នៃជាតិដែកនៃសូលុយស្យុងថ្នាំ ទៅក្នុង 25០០ml នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩% ដោយព្យតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេលពី ៣ម៉ោង៣០នាទីទៅ៤ម៉ោង ក្នុងថ្ងៃទី១និងថ្ងៃទី១៤។

ឱសថនេះអាចប្រើម្តងទៀតបាន នៅពេលណាដែលមានការថយចុះកំរិតជាតិដែកក្នុងឈាមកើតឡើង។

សំរាប់ប្រើចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺខ្សោយកំរៃនោមដែលនាក់ធននីឲការលាចឈាមតាមផ្លូវខាចគុថនៃពោះ៖

-កំរិតប្រើត្រូវចែកជា៣ដង ដោយបង្ហូរយឺតៗតាមសេរ៉ូម ក្នុងរយៈពេល២៨ថ្ងៃ ដោយបែងចែកកំរិតប្រើដូចខាងក្រោម៖

- ពេលព្យ២ដងដំបូង ក្នុងកំរិត 3០០mg នៃកំរិតជាតិដែក ក្នុងរយៈពេល ១ម៉ោង៣០នាទី។

- ១៤ថ្ងៃក្រោយមក ត្រូវព្យ១ដងទៀត ក្នុងកំរិត 4០០mg នៃកំរិតជាតិដែក ក្នុងរយៈពេល ២ម៉ោង៣០នាទី។ឱសថនេះត្រូវឈាយជាមួយកំរិតអតិបរិមា

25០ml នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩%។

- ឱសថនេះអាចប្រើម្តងទៀតបាន នៅពេលណាដែលមានការថយចុះកំរិតជាតិដែកក្នុងឈាមកើតឡើង។

សំរាប់ប្រើព្យាបាលមន្ត្រីពោះកូនគុថ (ឈាមចាប់ពី២ឆ្នាំ៖ឆ្នាំ១៖៧) ដែលមានជំងឺខ្សោយកំរៃនោមកុំវ៉ែរី និឲលាចឈាមតាមសរសៃឈាម៖

-មិនមានការសិក្សាបញ្ជាក់ពីកំរិតប្រើឱសថនេះចំពោះកូនក្មេងដែលមានស្ថានភាពជំងឺខាងលើនេះទេ។

-សំរាប់ការព្យាបាលបំប៉ងជាតិដែក៖ កំរិតប្រើគឺ 0.5mg ក្នុងទម្ងន់១គីឡូក្រាម (មិនត្រូវប្រើលើសពី 1០០mg ក្នុងពេលប្រើម្តងទេ)

រៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តង សំរាប់រយៈពេល១២សប្តាហ៍ ដោយចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេល៥នាទី ឬឈាយក្នុង 25ml

នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩% ហើយព្យតក្នុងរយៈពេលពី៥ទៅ៦០នាទី។ ឱសថនេះអាចប្រើម្តងទៀតបាន ប្រសិនបើចាំបាច់។

សំរាប់ប្រើព្យាបាលមន្ត្រីពោះកូនគុថ (ឈាមចាប់ពី២ឆ្នាំ៖ឆ្នាំ១៖៧) ដែលមានជំងឺខ្សោយកំរៃនោមកុំវ៉ែរីមិននាក់ធន នីឲការលាចឈាម ៖

-មិនមានការសិក្សាបញ្ជាក់ពីកំរិតប្រើឱសថនេះចំពោះកូនក្មេងដែលមានស្ថានភាពជំងឺខាងលើនេះទេ។

-សំរាប់ការព្យាបាលបំប៉ងជាតិដែក៖ កំរិតប្រើគឺ 0.5mg ក្នុងទម្ងន់១គីឡូក្រាម (មិនត្រូវប្រើលើសពី 1០០mg ក្នុងពេលប្រើម្តងទេ)

រៀងរាល់៤សប្តាហ៍ម្តង សំរាប់រយៈពេល១២សប្តាហ៍ ដោយចាក់យឺតៗតាមសរសៃឈាមក្នុងរយៈពេល៥នាទី ឬឈាយក្នុង 25ml

នៃសូលុយស្យុងសេរ៉ូមប្រៃ 0,៩% ហើយព្យតក្នុងរយៈពេលពី៥ទៅ៦០នាទី។ ឱសថនេះអាចប្រើម្តងទៀតបាន ប្រសិនបើចាំបាច់។

X លេខបញ្ជីភា : CAM N0748IP-16

XI ឥរិយាបថៈ Nitin Lifesciences Ltd., (India)

បានបកប្រែនិងត្រួតពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង។