

មរិយាឃប់ឡូទិសថ
រេលំហូរីនេ ព្យូតាមសរសៃឈាម

ALGORENS

I រូបភាពឱសថ :

-ជាឱសថប្រភេទសុលុយស្យុងសំរាប់ចាក់ព្យូតាមសរសៃឈាម
 -១ប្រអប់មាន ១ដបឆ្លាស្ទិកចំណុះ 100ml

II សមាសធាតុផ្សំ : ក្នុង 100ml មាន៖

-Paracetamol.....1000mg

III គុណភាពព្យាបាល :

ឱសថនេះជាប្រភេទសុលុយស្យុងសំរាប់ចាក់ព្យូតាមសរសៃឈាមប្រើព្យាបាលក្នុងរយៈពេលខ្លីសំរាប់បំបាត់ការឈឺចាប់កំរិតមធ្យម
 ជាពិសេសក្រោយ ពេលវះកាត់ និងបញ្ចុះកំដៅ។

IV ការប្រើប្រាស់ :

ឱសថនេះហាមប្រើចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 -ចំពោះអ្នកងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង Paracetamol ឬជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំណាមួយនៃឱសថនេះ។
 -ចំពោះអ្នកមានជំងឺខ្លះគ្រាប់ឈាមក្រហម
 -ចំពោះកូនក្មេងអាយុក្រោម១ឆ្នាំ

V ការប្រុងប្រយ័ត្ន :

ឱសថនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 -ចំពោះអ្នកមានជំងឺខ្លះគ្រាប់ឈាមក្រហម
 -ចំពោះអ្នកមានជំងឺខ្សោយតំរងនោមធ្ងន់ធ្ងរ (creatinine < 30ml/min)
 -ចំពោះអ្នកញៀនស្រាវ៉ាវី
 -ចំពោះអ្នកមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភវ៉ាវី
 -មិនត្រូវផឹកស្រាអំឡុងពេលប្រើឱសថនេះទេ
 -មិនត្រូវប្រើឱសថនេះលើសកំរិតណែនាំ
 -មិនត្រូវប្រើឱសថហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់
 -ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅដោះកូន៖ ការប្រើឱសថនេះចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅដោះកូនត្រូវមានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។

VI ផលរំខានរូបមាណ :

-ផលរំខានទូទៅ (កំរើតមាន)៖ អស់កម្លាំង ងាយមានប្រតិកម្ម
 -វិបត្តិសរសៃឈាមបេះដូង (កំរើតមាន)៖ សំពាធឈាមថយចុះ
 -វិបត្តិថ្លើម (កំរើតមាន)៖ កើនឡើងកំរិតអង់ហ្ស៊ីមក្នុងថ្លើម
 -វិបត្តិស្បែកនិងជាលិកាក្រោមស្បែក (កំរើតមានបំផុត)៖ ប្រតិកម្មអាណែរគីស្បែកធ្ងន់ធ្ងរ
 -វិបត្តិគ្រាប់ឈាម (កំរើតមានបំផុត)៖ ថយចុះចំនួនប្លាកែត កើនឡើងចំនួន neutrophils ក្នុងឈាម
 > ត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើមានផលរំខានណាមួយកើតឡើង។

VII អន្តរកម្មឱសថ :

គួរជៀសវាងប្រើរួមគ្នាជាមួយឱសថដូចខាងក្រោម៖
 -Anticoagulants
 -Hepatotoxic drugs/hepatic enzymes
 -Probenecid
 -Salicylamide

VIII ការរក្សាទុក :

-ត្រូវរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម ៣០°C
 -ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅថ្ងៃនិងសំណើម
 -ត្រូវទុកឲ្យផុតពីជំងឺកូនក្មេង
 -មិនត្រូវប្រើឱសថនេះទេប្រសិនបើសុលុយស្យុងក្នុងដបឡើងល្អក់ឬដបឆ្លាយ

IX ការប្រើប្រាស់កំរិតណែនាំ :

-ធ្វើឲ្យខូចកោសិការក្រហមនិងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់

X កំរិតនិចរៀមប្រើ :

❖ រៀបចំប្រើ :

-ឱសថនេះប្រើសំរាប់ចាក់ព្យូតាមសរសៃឈាមយឺតៗក្នុងរយៈពេល១៥នាទី។
 -ត្រូវទុកចន្លោះពេលប្រើអប្បបរមា៤ម៉ោងដាច់ពីគ្នា។
 -មិនត្រូវប្រើឱសថនេះលើសពី៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ។

❖ កំរិតប្រើប្រាស់ :

-ចំពោះមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យជំទង់៖ ទម្ងន់លើសពី 50kg និងមិនមានហានិភ័យពុលថ្លើម៖
 កំរិតណែនាំឲ្យប្រើគឺ 1g (ស្មើនឹង 100mlនៃសុលុយស្យុងថ្នាំ 10mg/ml) ហើយអាចបង្កើនកំរិតប្រើប្រាស់ ៤g ដែលជាកំរិតប្រើអតិបរិមា ក្នុង១ថ្ងៃ។

-ចំពោះមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យជំទង់៖ ទម្ងន់លើសពី 50kg និងមានហានិភ័យពុលថ្លើម៖ កំរិតណែនាំឲ្យប្រើគឺ 1g

(ស្មើនឹង 100mlនៃសុលុយស្យុងថ្នាំ 10mg/ml) ហើយអាចបង្កើនកំរិតប្រើប្រាស់ ៣g ដែលជាកំរិតប្រើអតិបរិមា ក្នុង១ថ្ងៃ។

-ចំពោះមនុស្សពេញវ័យទម្ងន់ក្រោម 50kg និងទម្ងន់លើសពី 33kg៖ កំរិតណែនាំឲ្យប្រើគឺ 15mg ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg (ស្មើនឹង 1.5mlនៃសុលុយស្យុងថ្នាំ

10mg/ml ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg) ។ កំរិតប្រើអតិបរិមាប្រចាំថ្ងៃគឺមិនត្រូវលើសពី 60mg នៃ Paracetamol ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg ឬ 3g នៃ Paracetamol ក្នុង១ថ្ងៃ។

-ចំពោះកូនក្មេងទម្ងន់ចន្លោះពី 10kg ទៅ 33kg៖ កំរិតណែនាំឲ្យប្រើគឺ 15mg ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg (ស្មើនឹង 1.5mlនៃសុលុយស្យុងថ្នាំ

10mg/ml ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg) ។ កំរិតប្រើអតិបរិមាប្រចាំថ្ងៃគឺមិនត្រូវលើសពី 60mg នៃ Paracetamol ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg ឬ 2g នៃ Paracetamol ក្នុង១ថ្ងៃ។

-ចំពោះទារកទម្ងន់ក្រោម 10kg៖ កំរិតណែនាំឲ្យប្រើគឺ 7.5mg ក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg (ស្មើនឹង 0.75ml នៃសុលុយស្យុងថ្នាំ 10mg/mlក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg) ។

កំរិតប្រើអតិបរិមាប្រចាំថ្ងៃគឺមិនត្រូវលើសពី 30mg នៃ Paracetamolក្នុងទម្ងន់ខ្លួន 1kg។

-កំរិតប្រើចំពោះអ្នកជំងឺខ្សោយតំរងនោមធ្ងន់ធ្ងរ៖ ប្រសិនបើកំរិត creatinine ក្នុងឈាមតិចជាងឬស្មើ 30ml/min ត្រូវទុកចន្លោះពេលប្រើ ៦ម៉ោង ដាច់ពីគ្នា។

> មុននឹងប្រើឱសថនេះ ត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

XI លេខបញ្ជីការ : CAM N0016IP-17

XII ផលិតករ : Abaris Healthcare Pvt. Ltd. (India)

បានបកប្រែនិងត្រួតពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខារពេទ្យនិងគ្រឿងសំអាង។

លេខៈ១៧៤៤/១៧ឱអបស ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧