

បរេយោយម័ត្តន្ត ឱសថ
ហ្វ្រាឡូឡុម ល្អ្រុកាមស រែស ឈាម

FARFOLEX

Solution for Infusion
Ofloxacin 200mg

I រុមគាណឱសថ :

- ជាឱសថប្រភេទសូលុយស្យុងសំរាប់ចាក់ល្អ្រតាមសរសៃឈាម
- ១ប្រអប់មាន ១ដបប្លាស្ទិក ចំណុះ 100ml

II ស មាស នាគុឡ័្យ : ក្នុង 100ml មាន៖

- Ofloxacin.....200mg

III គុណភាពព្យាបាល :

- ជាប្រភេទឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកប៊ិកក្នុងក្រុម quinolone ប្រើសំរាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងច្រើនប្រភេទដែលកបនឹងឱសថនេះដូចជា៖
 - ជំងឺឆ្លងក្នុងផ្លូវដង្ហើម ដូចជា៖
 - o ជំងឺរលាកសួត
 - o ជំងឺរលាកទងសួតស្រូចស្រាវនិងវ៉ាំវី
 - ជំងឺឆ្លងក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើស្រូចស្រាវនិងវ៉ាំវី (លើកលែងតែជំងឺរលាកអាមីដាលស្រូចស្រាវ)
 - ជំងឺឆ្លងលើស្បែកនិងជាលិកាទន់
 - ជំងឺឆ្លងក្នុងឆ្អឹងនិងសន្លាក់
 - ជំងឺឆ្លងផ្លែខាងក្នុងពោះ
 - ជំងឺឆ្លងក្នុងផ្លូវក្រពះពោះវៀន
 - ជំងឺឆ្លងនិងរលាកឆ្អឹងត្រជាក់
 - ជំងឺឆ្លងនិងរលាកផ្លូវបន្តពូជនិងផ្លូវបង្ហូរនោមកំរិតស្រាលនិងធ្ងន់ធ្ងរ
 - ជំងឺប្រម៉េះមាក់ស្បូន និងប្រម៉េះទឹកបាយដោយសារមេរោគហ្គូណូកូក
 - ជំងឺរលាកព្រេណូប្រូស្តាត
 - ជំងឺមេរោគរីកសាយភាយក្នុងឈាម
 - បង្ការជំងឺឆ្លងដោយចាក់ធើវចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយចុះខ្សោយ(ដូចជាករណីមានការកើនឡើងចំនួន neutrophils ចំពោះអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅដែលសង្ឃឹយថាមានជំងឺឆ្លង)

IV ការបារម្ភ្រុ :

- ឱសថនេះហាមប្រើចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 - ចំពោះអ្នកងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង ofloxacin ឬជាមួយឱសថផ្សេងទៀតក្នុងក្រុម fluoroquinolone ឬជាមួយសារធាតុផ្សំណាមួយនៃឱសថនេះ។
 - ចំពោះអ្នកជំងឺកូនក្មេងអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ
 - ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
 - ចំពោះស្ត្រីបំបៅដោះកូន
 - ចំពោះអ្នកជំងឺដែលថយចុះកំរិតអង់ហ្ស៊ីម glucose-6-phosphate dehydrogenase
 - ចំពោះអ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូក
 - ចំពោះអ្នកមានជំងឺរលាកសរសៃពួរសាច់ដុំដោយសារការប្រើឱសថក្នុងក្រុម fluoroquinolone កន្លងមក

V ការ្រុខ្រុ យ័ត្តុ :

- ឱសថនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 - ចំពោះអ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូក ឬអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិកើតជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល
 - ចំពោះអ្នកជំងឺធ្លាប់មានប្រវត្តិកើតជំងឺខ្សោយសាច់ដុំ
 - ចំពោះអ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារឆ្អើម ឬមុខងារតំរងនោម
 - ចំពោះកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង
 - ចំពោះមនុស្សចាស់
 - ក្នុងអំឡុងពេលប្រក្រោយការព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះអាចធ្វើឲ្យរាកដោយសារតែមានរលាកភ្លាសពោះវៀន។ ដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើឱសថនេះភ្លាមៗ ប្រសិនបើអាការៈរាករបស់អ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
 - ឱសថនេះមិនត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើជាទូទៅចំពោះកូនក្មេង និងមនុស្សវ័យជំទង លើកលែងតែមានផលចំណេញច្រើន ជាងហានិភ័យ។
 - ចំពោះអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះ អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការវិភាគរកសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម
 - ចំពោះអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះត្រូវជៀសវាងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬកាំរស្មី UV
 - ចំពោះអ្នកមានជំងឺពិណពូជដោយកំរែនភាពមិនធន់ជាមួយនឹងសារធាតុកាឡាក់តូស
 - ឱសថនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបើកបរនិងការបញ្ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីន
 - មិនត្រូវប្រើឱសថនេះលើសកំរិតណែនាំ
 - មិនត្រូវប្រើឱសថនេះហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់
 - មិនត្រូវប្រើឱសថនេះទេ ប្រសិនបើសូលុយស្យុងក្នុងដបឡើងល្អក់ ឬដបធ្លាយ

VI ផល័ខានុ :

- ផលវំខានុដែលកើតមានមិនសូវញឹកញាប់របស់ឱសថនេះរួមមាន៖
 - ជំងឺឆ្លងនិងការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង៖ ជំងឺផ្សិត
 - វិបត្តិគ្រាប់ឈាមនិងប្រព័ន្ធផលិតគ្រាប់ឈាម៖ កើនឡើងចំនួន eosinophils
 - វិបត្តិប្រព័ន្ធភាពស្ថាសរីរាង្គ៖ ប្រតិកម្មអាណហ្វ៊ីឡាក់ទិក
 - វិបត្តិអាហារូបត្ថម្ភនិងមេតាបូលីស៖ មិនសូវឃ្លាន
 - វិបត្តិផ្លូវចិត្ត៖ រវើវ៉ាយ គេងមិនលក់
 - វិបត្តិប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ៖ ឈឺក្បាល ធីងធោង គេងមិនលក់ មិនសូវដឹងរសជាតិ

- វិបត្តិចត្តុ៖ ស្រវាំងភ្នែក រមាស់ភ្នែក
- វិបត្តិត្រចៀកនិងបំពង់សំលេង៖ ហឹងត្រចៀក វិលមុខ
- វិបត្តិបេះដូង៖ បេះដូងដើរញាប់
- វិបត្តិសរសៃឈាម៖ រលាកសរសៃឈាម
- វិបត្តិផ្លូវដង្ហើម៖ ពិបាកដកដង្ហើម
- វិបត្តិក្រពះពោះវៀន៖ កួត ចង្អោរ រាក ហើមពោះ ពិបាករំលាយអាហារ
- វិបត្តិស្បែកនិងជាលិកាទន់៖ ឡើងកន្ទួលរមាស់ ក្រហមស្បែក កន្ទាលត្រអាក
- វិបត្តិឆ្អើមនិងប្រម៉ាត់៖ កើនឡើងអង់ហ្ស៊ីមក្នុងឆ្អើម កើនឡើងកំរិតប៊ីលីរុយប៊ីនក្នុងឆ្អើម
- វិបត្តិឆ្អឹងសាច់ដុំ៖ ឈឺឆ្អឹងសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ រលាកសរសៃពួរសាច់ដុំ
- វិបត្តិតំរងនោម៖ កើនឡើងកំរិត creatinine ក្នុងឈាម
- វិបត្តិទូទៅនិងលើកន្លែងច្រើ៖ អស់កម្លាំង ក្តៅខ្លួន ឈឺលើកន្លែងច្រើ

> ត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើមានប្រតិកម្មវំខានណាមួយកើតឡើង។

VII អន្ទុកម្មឱសថ :

- គួរជៀសវាងប្រើរួមផ្សំគ្នាជាមួយឱសថដូចខាងក្រោម៖
 - Antiarrhythmics, Tricyclic antidepressants, Macrolides, Antipsychotics
 - Anticoagulants
 - Theophylline, Fenbufen or NSAIDs
 - Glibenclamid
 - Probenecid, Cimetidine, Furosemide, Methotrexate
 - Vitamin K antagonists

VIII ការកែគ្រូឡុកុ :

- ត្រូវវក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 3០°C
- ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅថ្ងៃ និងសំណើម
- ត្រូវទុកឲ្យផុតពីដៃកូនក្មេង

IX គំរេត នទះរៀមរ្រុ :

o កំរិតច្រើ៖

- កំរិតច្រើឱសថនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនិងសភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺឆ្លង។ កំរិតច្រើប្រចាំថ្ងៃរបស់ឱសថនេះអាចច្រើរហូតដល់ 400mg ច្រើតែ១ដងគត់ ក្នុង១ថ្ងៃ។ ក្នុងករណីច្រើបែបនេះ ជាការល្អប្រសើ ឱសថនេះគួរប្រើនៅពេលព្រឹក។
- កាលណាកំរិតច្រើប្រចាំថ្ងៃលើសពី 400mg ត្រូវច្រើចែកជា២ដង ក្នុងចន្លោះពេលស្ទើរគ្នា ក្នុងថ្ងៃ។
- ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ៖** កំរិតច្រើធម្មតាតាមសរសៃឈាមចំពោះមនុស្សពេញវ័យមានដូចខាងក្រោម៖
 - សំរាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងក្នុងផ្លូវបង្ហូរនោមកំរិតស្រាលនិងកំរិតធ្ងន់៖ កំរិតណែនាំឲ្យច្រើគឺ 200mg ក្នុង១ថ្ងៃ។
 - សំរាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងក្នុងផ្លូវដង្ហើម៖ កំរិតណែនាំឲ្យច្រើគឺ 200mg ច្រើ២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ។
 - សំរាប់ព្យាបាលជំងឺមេរោគសាយភាយក្នុងឈាម៖ កំរិតណែនាំឲ្យច្រើគឺ 200mg ច្រើ២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ។
 - ជំងឺឆ្លងលើស្បែកនិងជាលិកាទន់៖ កំរិតច្រើគឺ 400mg ច្រើ២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ។

ចំពោះកូនក្មេង និងមនុស្សវ័យជំទង៖

- ឱសថនេះមិនណែនាំឲ្យច្រើចំពោះកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង់កំពុងលូតលាស់ទេ។

ចំពោះមនុស្សចាស់៖ កំរិតច្រើគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទជំងឺឆ្លងនិងកំរិត creatinine របស់អ្នកជំងឺ។

ចំពោះអ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារតំរងនោម៖ កំរិតច្រើឱសថនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមកំរិត creatinine ក្នុងឈាមរបស់អ្នកជំងឺដូចខាងក្រោម៖

-កាលណាកំរិត creatinine នៅចន្លោះពី 50ml/min ទៅ 20ml/min៖ កំរិតច្រើគឺ 100mg ទៅ 200mg រៀងរាល់២៤ម៉ោងម្តង

-កាលណាកំរិត creatinine តូចជាង 20ml/min៖ កំរិតច្រើគឺ 100mg រៀងរាល់២៤ម៉ោងម្តង

-ករណីលាងឈាម៖ កំរិតច្រើគឺ 200mg រៀងរាល់៤៨ម៉ោងម្តង

ចំពោះអ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារឆ្អើម៖

-កំរិតណែនាំឲ្យច្រើគឺមិនត្រូវច្រើលើសពី 400mg ក្នុង១ថ្ងៃទេ។

o ការណែនាំពីរបៀបច្រើ៖

-ឱសថនេះច្រើចាក់ល្អ្រតាមសរសៃឈាមតែប៉ុណ្ណោះ។

-ត្រូវបង្ហូរផ្តាំនេះយឺតៗតាមសរសៃវ៉ែនតំដើម្បីជៀសវាងការរលាកសរសៃឈាម។

o រយៈពេលព្យាបាល៖

-រយៈពេលព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅតាមការឆ្លើយតបរបស់មេរោគឆ្លងនៃជំងឺ

-ដូចជាឱសថអង់ទីប៊ីយូទិកផ្សេងទៀតដែរ ការព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះត្រូវបន្តច្រើរយៈពេលពីថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្រោយពេល

បាត់រោគសញ្ញាជំងឺ។

-ក្នុងករណីភាគច្រើននៃជំងឺឆ្លងស្រូចស្រាវ រយៈពេលព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះគឺមានរយៈពេលពី៧ទៅ១០ថ្ងៃ។ នៅពេល

ដែលរោគសញ្ញាជំងឺបានធូស្រាលហើយ អ្នកជំងឺត្រូវប្តូរផ្តាំនេះពីការចាក់តាមសរសៃឈាមមកប្រើប្រភេទផ្តាំគ្រាប់លេបតាមមាត់វិញ។

-ការព្យាបាលដោយប្រើឱសថនេះគឺមិនត្រូវលើសពីរយៈពេល២ខែទេ។

> មុននឹងច្រើឱសថនេះ ត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

X លេខបញ្ជីកុកុ: CAM N01531P-17

XI នលិតនុដាយុ: Abaris Healthcare Pvt. Ltd. (India)

បានបកប្រែនិងត្រួតពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង។

លេខ ១៧៤៦១៧ ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧