

បរិយាយបណ្ណាញិសថ
លទដ្ឋា ត អង្គការអភិវឌ្ឍន៍

LINDAVIT ANTIOXI

I. រូបភាពខ្លីសង្ខេប:

ជាឱសថប្រភេទកាបស៊ីលីនទន់សម្រាប់លេប ក្នុង១ប្រអប់មាន៣បន្ទះ ក្នុង១បន្ទះមាន១០កាបស៊ីលី។

II. សមាសធាតុផ្សំ: ក្នុង១កាបស៊ីលីមាន:

- Beta Carotene USP equivalent to Beta Carotene 30% Dispersion.....10mg
- Zinc Sulfate Monohydrate BP.....27.5mg
- Selenium Dioxide.....70mcg
- Manganese (As Manganese Sulfate USP).....2mg
- Copper (As Anhydrous Copper Sulfate BP).....1mg

III. គុណភាពល្អាច្នាស:

Lindavit Antioxi សម្រាប់ព្យាបាល គ្រប់គ្រង ការពារ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំងឺ លក្ខខណ្ឌ និងរោគសញ្ញា:

- រោគសញ្ញាអេដស៍
- មេតាបូលីសកាបូអ៊ីប្រាត
- ខ្វះជាតិទង់ដែង
- សម្រាប់លាងភ្នែក និងត្រចៀក
- មេរោគអេដស៍
- ខ្វះជាតិសេលេនីញ៉ូម
- កម្រិតជាតិអេម៉ូក្លូប៊ីនទាប
- ចំនួនគោលិកាឈាមក្រហមទាប
- ជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង
- ធ្វើឱ្យចង្កាក់បេះដូងត្រឡប់មកធម្មតាយ៉ាងឆាប់រហ័ស
- មុខងារបន្តពូជ
- ការអភិវឌ្ឍឆ្អឹងនិងឆ្អឹងខ្ចី
- ការឆ្លងរោគលើស្បែក

IV. ការហាមឃាត់:

- អ្នកងាយមានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាសធាតុណាមួយនៃឱសថនេះ។
- ក្នុងអាយុក្រោម១២ឆ្នាំ
- អ្នកជំងឺប្រតិកម្ម

V. ការប្រុងប្រយ័ត្ន:

- ការប្រើប្រាស់ beta carotene ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុង RCT ជាមួយនឹង ការកើនឡើងហានិភ័យនៃការកើតមានមហារីកសួត និងអត្រាស្លាប់ចំពោះអ្នកជំងឺ Isotretinoin មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការពុលស្បែកដោយ COX2 inhibitor ដូចជា celecoxib ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពុលបេះដូងក្នុង RCTs សម្រាប់ការពារជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងទន្ធកូច។
- ឱសថនេះមានផ្ទុក Ponceau 3R (E124) ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានអាល្លែកប៊ូរី។
- Lindavit Antioxi កាបស៊ីលីមានផ្ទុក soya bean oil។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹងសណ្តែកដី ឬសណ្តែកសៀង ហាមប្រើឱសថនេះ។
- ប្រសិនបើអ្នកត្រូវលេបឱសថនេះ១ដង ត្រូវប្រើវាឱ្យបានឆាប់តាមអាចធ្វើបានលើកលែងតែវាជិតដល់ម៉ោងប្រើ១កម្រិតប្រើបន្ទាប់ (ក្នុងរយៈពេល១ទៅ២ម៉ោង)។ ហាមប្រើកម្រិតទ្វេដង។ បន្ទាប់មកប្រើតាមធម្មតាឡើងវិញ។ ហាមពិសារស្រា។

VI. ផលរំខាន: អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មអាល្លែកប៊ូរី (ដូចជាកន្ទួលរមាស់) និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធត្រពះ និងពោះវៀន(ដូចជាអារម្មណ៍ ឬកំពុងឈឺ និងឈឺពោះ)។

- ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងបំបៅដោះកូន: អត្ថប្រយោជន៍មានសក្តានុពលអាចធានាការប្រើប្រាស់ថ្នាំចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ទោះបីជាមានហានិភ័យក៏ដោយ។
- ចំពោះស្រ្តីបំបៅដោះកូន: ត្រូវប្រើតែក្នុងករណីមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ជាងគុណវិបត្តិចំពោះទារក។
- ភិទ្ធិពលចំពោះអ្នកបើកបរ និងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន: មិនមានការសិក្សាចំពោះការប្រើចំពោះអ្នកបើកបរ និងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន។

VII. កម្រិត និងរបៀបប្រើ:

មនុស្សពេញវ័យ និងមនុស្សចាស់ជរា: ពិសារ១ថ្ងៃ១កាបស៊ីលី ឬប្រើទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ។
> ការក្សាទុក: ត្រូវក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួត មិនត្រូវជូតខ្លួន នៅសីតុណ្ហភាពក្រោម៣០អង្សាសេ និងផុតពីដៃក្មេង។

VIII. លេខបញ្ជីគ្រឹះការ: CAM N1538IP-17
IX. ផលិតករ: RENOWN PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
143/A&B, VILLAGE - RANU, TAL – PADRA
CITY: RANU, DIST: VADODARA, GUJARAT STATE, INDIA.

បានបកប្រែដោយនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង